SCHEDA TECNICA

# AIOS® NPK 2-9-7

## DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Concime organo-minerale NPK in sospensione

2-9-7

## FUNZIONI

Stimola le attività metaboliche della pianta.
Incrementa la consistenza di fusti, steli e frutti.

## PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Liquido | Conducibilità: | 77,3 mS/cm |
| Colore: | Marrone | Densità: | 1,19 kg/lt |
| Odore: | Caratteristico | pH: | 8,1-8,5 |

## COMPOSIZIONE

| | |
|---|---|
| Azoto (N) totale | 2% |
| Azoto (N) organico solubile | 1,0% |
| Azoto (N) ureico solubile | 1,0% |
| Anidride fosforica ($P_2O_5$) totale solubile unicamente negli acidi minerali | 9,0% |
| Ossido di potassio ($K_2O$) solubile in acqua | 7,0% |
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 5,0% |

## COMPONENTI

Concimi organici: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali.
Concimi minerali: concime PK CE, urea.

## PACKAGING

Flaconi kg 1 (cartone da 20 kg)
Tanica da kg 6 (cartone da 24 kg), kg 12, kg 25.
Cisternetta 1190 kg

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

| **TRATTAMENTI PER VIA RADICALE E APPLICAZIONI AL SUOLO** | | |
|---|---|---|
| Tutte le colture | 1,5-3,0 lt/1000 $m^2$. Ripetere ogni 15 giorni. Prima della fertirrigazione diluire 1 litro di SURNAN® NPK in 200-250 litri di acqua. | |
| **APPLICAZIONE FOGLIARE** | | |
| **COLTURA** | **NUMERO TRATTAMENTI** | **DOSAGGIO** |
| Frutticole, vite, agrumi, olivo, actinidia, ortaggi da foglia, ortaggi da frutto, ortaggi a fiore, cereali, colture tropicali, IV gamma | 3-5 | 300-500 ml/hl |

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova per evitare danni alle colture.
PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.