SCHEDA TECNICA

ALERG® BIO

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Concime organico azotato fluido.

Carniccio in sospensione con Boro (B) e Zinco (Zn)

N + C 3 + 13

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Favorisce l'allegagione e lo sviluppo iniziale dei frutti.

Aiuta a diminuire problemi di cascola dei frutti.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato:	Liquido	Conducibilità:	48 mS/cm
Colore:	Bruno	Densità:	1,09 Kg/L
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 10%):	6,44
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico solubile	3,0%
Boro (B) solubile in acqua	0,23%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,13%
Carbonio (C) organico di origine biologica	13%

COMPONENTI

Concimi organici: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima di cromoVI=0 mg/kg di sostanza secca.
Concimi minerali: sale di zinco (solfato), boro etanolammina.
Aminoacidi totali (20,47% p/p), aminoacidi liberi (4,88% p/p): prolina (0,1% p/p), glicina (0,6% p/p), idrossiprolina (0,1% p/p) e triptofano (~ 0,5% p/p)
Propoli sol. 30%

Idrolizzati vegetali contenenti regolatori della crescita.

PACKAGING

Flaconi kg 0,250 (cartone da 12 kg), kg 1 (cartone da 20 kg), kg 2 (cartone da 24 kg) .
Taniche Kg 5 (cartone da 24 kg), kg 12, kg 20, kg 25.
Cisternetta kg 1100

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
Colture frutticole (pomacee, drupacee, nocciolo, actinidia, arancio)
Prefioritura, fioritura e allegagione 3,0-3,5 Kg/Ha.

Colture orticole (pomodoro, cetriolo, melone, zucca, ecc.)
Prefioritura e fioritura 3,0-3,5 Kg/Ha.
Distribuire il prodotto in 800-1000 litri di acqua.

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova per evitare danni alle colture.
PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.