SCHEDA TECNICA

BOTOUT®

DESCRIZIONE

CONCIME CE Reg. CE 2003/2003

Miscela fluida di microelementi

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Controlla le fisiopatie dovute a carenze di zinco e ferro.

Stimolante del metabolismo cellulare e fortificante della pianta.

Attività di nutriresistenza nei confronti di funghi parassiti: Botrytis, Alternaria, Fusarium, Sclerotinia.

Stimolante e sinergizzante in miscele indicate contro muffe, funghi e diverse specie di batteri.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Fluido	Solubilità in acqua:	100%
Colore:	Antracite	Densità:	1,07 Kg/l
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 10%):	6,88
Conducibilità:	19,91 mS/cm		

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) chelato EDTA solubile in acqua	0,3%
Zinco (Zn) solubile in acqua	1,7%

COMPONENTI

Ferro chelato con EDTA, Ossido di zinco.

Estratto di biomasse delle regioni dell'Europa e del Sud America.

Alcaloidi, flavonoidi, fenoli totali, tannini, sapogenine, destrina, acido salicilico, idrati di carbonio.

PACKAGING

Flacone 0,250 Kg (cartone da 12 Kg), 1 Kg (cartone da 20 Kg), 2 Kg (cartone da 24 Kg)
Tanica da 5 Kg (cartone da 20 Kg)

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicazione fogliare

Tutte le colture	200-300 cc/100 litri di acqua. (Ripetere il trattamento ogni 5-10 gg., bagnare bene l'apparato aereo)

Aumentare il dosaggio a 400-600 g/hl di acqua per migliorare la reattività della pianta agli stress.

Fertirrigazione

Tutte le colture	2-3 litri/ha (ripetere il trattamento ogni 5-10 giorni)

Non mescolare con prodotti a reazione acida e alcalina. Applicare con soluzioni neutre.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.