SCHEDA TECNICA

COGISIN®

DESCRIZIONE

CONCIME CE Reg. CE 2003/2003

Miscela fluida di microelementi

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

COGISIN® promuove radici più sane agendo sul sistema biologico terreno - radici. Agisce indirettamente sulle negatività presenti nel suolo disturbandone la localizzazione, riducendone la penetrazione, l'alimentazione. Rispetta la vita positiva del suolo per la crescita e le funzioni della radice. Migliora l'abilità della pianta a resistere allo stress ambientale.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Densità:	1,03 Kg/L
Colore:	Verde	pH (sol. al 10%):	4,46
Odore:	Caratteristico	Conducibilità:	31,4 mS/cm
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Concimi minerali: sale di manganese (solfato), sale di zinco (solfato), chelato di ferro EDTA

Estratti vegetali super-concentrato(*)	0,53%
Includendo: derivati della purina , acidi nucleici (DNA, RNA), acidi grassi vegetali	
Complesso aminoacidico	1,0%
Includendo: Cys, Asp, Glu, Phe, Gly, His, Ile, Lys, Leu, Mt, Asn, Pro, Gln, Arg, Ser, Thr, Val, Trp, Tyr	
Altri ingredienti:	98,47%
Includendo: acqua, Mg, Mo, Ni, Se, Ag, Ca,.	

(*) gli estratti vegetali deriva da:
Quercus falcata, Opuntia engelmannii var. *lindheimeri , Rhus aromatica, Rhizophoria mangle*

COMPONENTI

Manganese (Mn) solubile in acqua	0,5%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua	1,0%

PACKAGING

Flacone 0,250 kg (cartone da 12 kg), 1 kg (cartone da 20 kg)
Tanica da 5 kg (cartone da 20 kg).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	EPOCA DI APPLICAZIONE	DOSE PER HA
Orticole (pomodoro, zucchino, melone, anguria, melanzana, peperone, fagiolino, cipolla, carota, patata, etc.), colture industriali (tabacco, bietola, lattuga, etc.), fragola	Dopo la semina o il trapianto, oppure tra la semina e l'emergenza, alla prima irrigazione. Ripetere dopo 5-7 settimane dalla prima applicazione	3-4 kg/ha
Uva da tavola, uva da vino agrumi, ciliegio, pero, melo, albicocco, pesco, susino, actinidia	A partire dalla ripresa vegetativa, interventi ogni 60-90 giorni.	4-5 kg/ha
Riso, mais, cereali	Dalla semina all'emergenza.	2 kg/ha
Floricole. Vivaio	Dopo la semina o il trapianto, oppure tra la semina e l'emergenza. Ripetere ogni 60 giorni.	3-4 kg/ha

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Minima quantità d'acqua per l'applicazione:

- 200-250 litri di acqua per 1 kg di COGISIN®;
- 15-20 litri di acqua per 100 grammi di COGISIN®;
- 1000 litri di acqua per 3-5 kg di COGISIN®.

Criteri di applicazione:

- Applicare la soluzione di COGISIN® e acqua entro 8 ore dalla miscelazione;
- Applicazioni sul terreno con irrigazione a goccia o a spruzzo in modo da raggiungere le radici;
- L'impiego fogliare di COGISIN® è complementare alle applicazioni al terreno e non comporta rischi perle foglie;
- Effettuare applicazioni ogni 15 giorni con SPON® o SPON® BIO su tutte le colture.

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.