SCHEDA TECNICA

ENGROS® BIO

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Concime organico azotato fluido.

Miscela di concimi organici azotati fluida con Boro (B), Manganese (Mn) e Zinco (Zn)

N +C 5 + 18,5

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Favorisce l'ingrossamento dei frutti

Stimola le attività fisiologiche della pianta.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Conducibilità:	103,4 mS/cm
Colore:	Marroncino	Densità:	1,22 Kg/L
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 1%):	7,10
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) organico solubile	5,0%
Boro (B) solubile in acqua	0,55%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,65%
Carbonio (C) organico di origine biologica	18,5%
Amminoacidi totali	31,78%
Amminoacidi liberi	7,65%

COMPONENTI

Concimi organici: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima di cromoVI=0 mg/kg di sostanza secca, borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali.
Concimi minerali: sale di manganese (solfato), ossidi di zinco, boro etanolammina.
Estratti vegetali contenenti regolatori della crescita, triptofano ed altri amminoacidi.

PACKAGING

Flaconi kg 0,250 (cartone da 12 kg), kg 1 (cartone da 20kg), kg 2 (cartone da 24 kg).
Taniche Kg 6 (cartone da 24 kg), kg 12, kg 25.
Cisternetta Kg. 1200.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Epoca di applicazione	Dosaggio
Orticole da foglia (insalata, lattuga, rucola, spinaci, sedano, carciofo)	Dalla quarta, quinta, foglia vera, ripetere il trattamento fogliare e/o radicale a cadenza di 7-10 gg.	3-4 kg/ha
Orticole da frutto (pomodoro, zucchino, peperone, melanzana, etc.)	Fase iniziale ingrossamento frutto, ripetere il trattamento fogliare e/o radicale a cadenza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Fragola	Fase iniziale ingrossamento frutto, ripetere il trattamento fogliare e/o radicale a cadenza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Melone, anguria	Fase iniziale ingrossamento frutto, 2-3 trattamenti fogliari e/o radicali a distanza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Drupacee	Fase iniziale ingrossamento frutto, 2-3 trattamenti fogliari a distanza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Colture in idroponica	Fase iniziale ingrossamento frutto, ripetere il trattamento fogliare e/o radicale a cadenza di 7 gg.	2-3 kg/ha
Frutticole (agrumi, vite, olivo)	Fase iniziale ingrossamento frutto, 2 trattamenti fogliari a distanza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Kiwi	Applicazione fogliare da effettuarsi nelle fasi: caduta petali non completa, dopo 7 gg dalla caduta petali. Ripetere il trattamento dopo 7-10 gg.	3-4 kg/ha

MISCIBILITA'

ENGROS® BIO è miscibile con i più comuni fertilizzanti e agrofarmaci in commercio. Non miscelare con poltiglie a base di solfati di rame, magnesio, zinco, ecc. In casi dubbi effettuare dei saggi prova al fine di non arrecare danni alle colture.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.