SCHEDA TECNICA

ENGROS®

Codice prodotto: 0502

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n°75/2010

Concime organo-minerale.

NPK 5-7-5 in sospensione con microelementi a basso tenore di cloro.

FUNZIONI

Favorisce l'ingrossamento dei frutti

Stimola le attività fisiologiche della pianta.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Conducibilità:	55,10 mS/cm
Colore:	Marrone scuro	Densità:	1,21 Kg/L
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 1%):	4,97
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) organico solubile	1,0%
Azoto (N) ureico solubile	4,0%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	7%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	7%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua a basso contenuto di cloro	5%
Boro (B) solubile in acqua	0,1%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,14%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,1%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,1%
Carbonio (C) organico di origine biologica	3%
Amminoacidi totali	6,95%
Amminoacidi liberi	1,97%

COMPONENTI

Concimi organici: epitelio animale idrolizzato fluido, estratto di alghe.
Concimi minerali: urea, concime CE PK, sali di ferro (solfato), di manganese (solfato), ossido di zinco, boro etanolammina.

PACKAGING

Flaconi kg 0,250 (cartone da 12 kg), kg 1 (cartone da 20kg), kg 2 (cartone da 24 kg)
Taniche Kg 6 (cartone da 24 kg), kg 12, kg 25.
Cisternetta Kg. 1200

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Epoca di applicazione	Dosaggio
Orticole da foglia (insalata, lattuga, rucola, spinaci, sedano, carciofo)	Dalla quarta, quinta, foglia vera, ripetere il trattamento radicale a cadenza di 7-10 gg	2-3 kg/ha
Orticole da frutto (pomodoro, zucchino, peperone, melanzana, etc.)	Fase iniziale ingrossamento frutto, ripetere il trattamento fogliare e/o radicale a cadenza di 7 gg.	2-3 kg/ha
Fragola	Fase iniziale ingrossamento frutto, ripetere il trattamento fogliare e/o radicale a cadenza di 7 gg.	2-3 kg/ha
Melone, anguria	Fase iniziale ingrossamento frutto, 2-3 trattamenti fogliari e/o radicali a distanza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Drupacee	Fase iniziale ingrossamento frutto, 2-3 trattamenti fogliari a distanza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Colture in idroponica	Fase iniziale ingrossamento frutto, ripetere il trattamento fogliare e/o radicale a cadenza di 7 gg.	2-3 kg/ha
Frutticole (agrumi, vite, olivo)	Fase iniziale ingrossamento frutto, 2 trattamenti fogliari a distanza di 7 gg.	3-4 kg/ha
Kiwi	Applicazione fogliare da effettuarsi nelle fasi: caduta petali non completa, dopo 7 gg dalla caduta petali. Ripetere il trattamento dopo 7-10 gg.	3-4 kg/ha

(*) *Applicazioni fogliari:* quantità di acqua per l'applicazione: 400 litri di acqua per ettaro di superficie.

MISCIBILITA'

ENGROS® è miscibile con i più comuni fertilizzanti e agrofarmaci in commercio. Non miscelare con poltiglie a base di solfati di rame, magnesio, zinco, ecc. In casi dubbi effettuare dei saggi prova al fine di non arrecare danni alle colture.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.