SCHEDA TECNICA

GLICIRAM BIO®

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010.

Concime organico azotato fluido. Carniccio fluido in sospensione con rame (Cu) N+C.

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Controlla i sintomi da carenze di rame.

Promuove la funzionalità cellulare e di autodifesa attiva delle piante.

Sinergizzante in miscela con agrofarmaci per la protezione da malattie fungine e batteriche.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Densità:	1,21 Kg/L
Colore:	Verde scuro	pH (sol. al 10%):	3,50
Odore:	Caratteristico	Conducibilità:	13,00 mS/cm
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	4%
Azoto (N) organico solubile	4,0%
Rame (Cu) solubile in acqua	4,0%
Carbonio (C) organico di origine biologica	13%

COMPONENTI

Concimi organici: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima di cromoVI=0 mg/kg di sostanza secca.

Concimi minerali: sali di rame (solfato)

Amminoacidi totali 26,86% p/p, amminoacidi liberi 3,97% p/p

PACKAGING

Flacone 0,250 Kg (cartone da 12 Kg), 1 Kg (cartone da 20 Kg).

Tanica da 6 Kg (cartone da 24 Kg), 12 Kg, 25 kg.

Cisternetta da Kg 1250.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE		
COLTURA	**FASI TRATTAMENTI**	**DOSAGGIO**
Vite (dalla ripresa vegetativa alla fioritura)	4-7	1,5-2 Kg/ha
Olivo, cereali, leguminose (cece, pisello, favino, etc.)	2	1,5-3 Kg/ha
Cetriolo, anguria, melone, zucca, zucchino	2	1-1,2 Kg/ha
Pomacee, drupacee, nocciolo, actinidia	2-3	1,5-2,5 Kg/ha
Ortaggi a foglia	3-4	0,5 Kg/ha
Pomodoro a pieno campo	3-5	2- 3 Kg/ha
TRATTAMENTI PER VIA RADICALE E APPLICAZIONI AL SUOLO		
Tutte le colture	Utilizzare dosaggi doppi rispetto alle applicazioni per via fogliare	

NB: in casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.