SCHEDA TECNICA

KISTART® NP CaO

DESCRIZIONE

CONCIME CE Reg. CE 2003/2003

Concimi fluidi composti
Soluzione di concimi NP (CaO) 3–20 (6)

FUNZIONI

Previene i sintomi e le fisiopatie dovute alla carenza di calcio quali: butteratura amara del pero, marciume apicale del pomodoro, seccume della lattuga, rottura degli acini della vite, scarsa conservabilità di melone e della fragola.

Previene i sintomi e le fisiopatie dovute alla carenza di fosforo quali: nanismo, maturazione tardiva dei frutti, diminuzione della dimensione e della colorazione dei fiori, scarso sviluppo radicale e dei bulbi, scarsa lignificazione dei tessuti.

Migliora la pezzatura e le caratteristiche organolettiche dei frutti riducendo l'effetto spaccatura dei frutti carnosi (cracking).

Riduce l'effetto "Tip burn", aumenta la resistenza alla siccità, aumenta la turgescenza.

Induttore di resistenza.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Solubilità in acqua:	100%
Colore:	trasparente con riflessi cromati	Conducibilità:	67,9-68,5 mS/cm
		Densità:	1,2 Kg/L
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 10%):	0,8-1,3

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	3%
Azoto (N) ureico solubile	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	20%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	6%

COMPONENTI

Concimi minerali: urea, calce idrata, acido fosforoso.

PACKAGING

Flacone da 2 kg (cartone da 24 Kg)
Tanica da 6 Kg (cartone da 24 Kg), 12 Kg, 25 kg, 30 Kg
Cisternetta da Kg 1200

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE	
Vite, pomacee, drupacee, agrumi, olivo, actinidia	2-3 Kg/ha (200-300 gr./hl di acqua) 2-3 trattamenti dalla ripresa vegetativa
Orticole (pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, cetriolo, insalate, fragola, melone, anguria) Colture industriali (girasole, soia, tabacco, barbabietola da zucchero etc.)	Pieno campo: 2-3 kg/ha 2-3 trattamenti dalla ripresa vegetativa
Colture in serra - aromatiche	Trattamenti post trapianto ogni 10-15 giorni: 200-250 ml/hl di acqua
Tappeti erbosi - florovivaismo	Trattamenti post trapianto ogni 10-15 giorni: 150-200 ml/hl di acqua

FERTIRRIGAZIONE	
Tutte le colture	6-8 kg/ha

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina, solfato di Cu, poltiglie bordolesi, ossicloruri, etc.

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alla colture.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.