SCHEDA TECNICA

KUGEL® ORTICA

DESCRIZIONE

ESTRATTO CONCENTRATO DI FOGLIE DI ORTICA (Urtica dioica N. CAS 84012-40-8)

Sostanza di base

Normativa: regolamento (CE) n. 1107/2009

Documento SANCO 11809/2016-rev 0.1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419

Ai sensi dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 questo prodotto è utilizzabile per le produzioni biologiche.

FUNZIONI

Le sostanze attive presenti nell'estratto di ortica sono particolarmente efficaci contro fitofagi (afidi, altiche, tignole, carpocapse, acari) e crittogami (alternaria, peronospera, oidio, ecc).

Le sostanze attive hanno un'azione tossica verso i parassiti presenti sulle piante rendondole inospitali. In tal modi essi si allontanano dalla pianta stessa liberandola dalla loro dannosa presenza.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato:	Liquido	Solubilità in acqua:	100%
Colore:	Marrone	Densità:	1,02 g/mL
Odore:	Caratteristico	pH	3,59

COMPOSIZIONE

Estratto concentrato di foglie di Ortica (Urtica dioica L. N. CAS 84012-40-8)

DER (Drought Extract Ratio) 1:7

COMPONENTI

Flavonoidi, fenoli, sapogenine, acido formico, istamina, acetilcolina.

PACKAGING

Flacone da 1 L (cartone da 20 L),
Tanica 5 L (cartone da 20 L), tanica da 20 L, tanica da 25 L,
Cisternetta da Kg 1000 L.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TIPI DI COLTURE	INSETTI E MALATTIE	DOSE [L/HA]	Acqua [L/ha]	NUMERO MIN/MAX DI APPLICAZIONI
Alberi da frutto	Afidi	9-27	300-900	1/5
Fagiolo		16-27	300-500	1/5

TIPI DI COLTURE	INSETTI E MALATTIE	DOSE [L/HA]	Acqua [L/ha]	NUMERO MIN/MAX DI APPLICAZIONI
Patata		9-15	300-500	1/5
Insalata, cavoli		9-15	300-500	1/5
Sambuco		12,5-25	400-800	1/5
Rose, spirea		9,5-19	300-600	1/5
Brassicaceae (cavolo, ravanello)	Altiche, tignole	9-15	300-500	1/6
Melo, pero	Carpocapse	9-27	300-900	3
Fagiolo	Acari (*)	18-30	300-500	1/6
Vite		9,5-19	300-600	1/6
Brassicaceae (cavolo, ravanello)	Alternaria	9-15	300-500	1/6
Cucurbitacee		9 - 15	300-500	1/6
Alberi da frutto	Alternaria (macchie nere), moniliosi	9 - 27	300-900	1/6
Vite	Funghi	9,5- 19	300-600	1/6
Patata		9-15	300-500	1/6

Intervallo pre-raccolta = 7 giorni
Intervalli tra due applicazioni = 15 giorni
(*) Acari, Intervalli tra due applicazioni = 21 giorni

Applicare il prodotto nei mesi primaverili ed estivi.
NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture
PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.