SCHEDA TECNICA

MS-200® BIO

DESCRIZIONE

CONCIME CE Reg. CE 2003/2003

Miscela di microelementi Zinco (Zn) e Molibdeno (Mo).

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Favorisce il mantenimento cromatico della cuticola e dell'ipoderma degli acini e delle bacche.
Attiva e migliora la traslocazione dei metaboliti.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Sospensione concentrata	Solubilità in acqua:	100%
		Conducibilità:	9,39 mS/cm
Colore:	Giallastro	Densità:	1,37 kg/L
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 10%):	7,88

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) totale	3%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	1%

COMPONENTI

Molibdato di sodio, ossido di zinco.

PACKAGING

Flaconi kg 1 (cartone da 20kg), 2 Kg (cartone da 24 Kg)
Tanica da Kg 5 (cartone da 20 kg), 10 kg, 25 kg

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture: vite, melo, pesco, nettarine, pomodoro, carciofo, fragola, floricole, kiwi, melanzana, cetriolo, peperone, melone, anguria, zucchino, ornamentali, cereali, colture industriali.

Applicazione fogliare: 400 grammi per 100 litri di acqua. Si consigliano 2-3 applicazioni ad intervalli di 7-10 giorni.
Aumentare il dosaggio a 5-6 kg/ha per migliorare la reattività della pianta agli stress.
Applicazioni durante il riposo vegetativo:
Ciliegio, uva da tavola: 400-500 grammi per 100 litri di acqua. Bagnare con un quantitativo sufficiente di acqua.

Fertirrigazione: 4-6 kg/ha.
Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto, non superare le dosi indicate.

Ciliegio, uva da tavola. Riposo vegetativo. 400 grammi per 100 litri di acqua. Si consigliano 2-3 applicazioni ad intervalli di 7-10 giorni.
NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova per evitare danni alle colture

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.