SCHEDA TECNICA

MS-200®

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Concime a base di microelementi

Miscela fluida di microelementi con Zolfo (S)

FUNZIONI

Azione barriera indotta dalla formazione di una pellicola persistente del prodotto.

Attiva e migliora la traslocazione dei metaboliti.

Non altera le caratteristiche cromatiche della cuticola e dell'ipoderma degli acini, delle bacche, etc..

Contiene zolfo elementare, elemento fondamentale per la formazione di aminoacidi solforati (cistina e metionina) che interagiscono nella sintesi delle proteine, da cui dipende il valore nutritivo dei prodotti agricoli.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Sospensione concentrata	Solubilità in acqua:	100%
		Conducibilità:	9,39 mS/cm
Colore:	Giallastro	Densità:	1,37 kg/L
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 10%):	7,88

COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale	40%
Zinco (Zn) solubile in acqua	3%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	1%

COMPONENTI

Sale di molibdeno, ossido di zinco, zolfo.

PACKAGING

Flaconi kg 1 (cartone da 20 kg), 2 Kg (cartone da 24 Kg)

Tanica da Kg 5 (cartone da 20 kg), 10 kg, 25 kg

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture: vite, melo, pesco, nettarine, pomodoro, carciofo, fragola, floricole, ciliegio, kiwi, melanzana, cetriolo, peperone, melone, anguria, zucchino, ornamentali, cereali, colture industriali.

Applicazione fogliare preventiva: 400 grammi per 100 litri di acqua. Si consigliano 2-3 applicazioni ad intervalli di 7-10 giorni.

Aumentare il dosaggio a 5-6 kg/ha per migliorare la reattività della pianta agli stress.

Applicazioni durante il riposo vegetativo:
Ciliegio, uva da tavola: 400-500 grammi per 100 litri di acqua. Bagnare con un quantitativo sufficiente di acqua.

Fertirrigazione: 4-6 kg/ha.
NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova per evitare danni alle colture.PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.