SCHEDA TECNICA

SORESOL® BIO

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Concime Organo-Minerale NK fluido

NK 5-5 fluido in sospensione a basso tenore di cloro.

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Migliora la pezzatura e le caratteristiche organolettiche dei frutti.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Conducibilità:	25,0 mS/cm
Colore:	Marroncino	Densità:	1,18 Kg/l
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 10%):	7,05
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	5%
Azoto (N) organico solubile	5,0%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro	5%
Boro (B) solubile in acqua	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,10%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,01%
Carbonio (C) organico di origine biologica	16,5%

COMPONENTI

Concimi organici: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima di cromoVI=0 mg/kg di sostanza secca.

Concimi minerali: sale di zinco (solfato), sale di manganese (solfato), soluzione di sali potassici a basso tenore di cloro, boro etanolammina.

Estratti vegetali.

Metaboliti di origine biologico.

Betaina.

Amminoacidi totali 31,88%; amminoacidi liberi 5,15%.

PACKAGING

Flacone 0,250 Kg (cartone da 12 Kg), 1 Kg (cartone da 20 Kg), 2 kg (cartone da 24 kg)
Tanica da 5 Kg (cartone da 20 Kg), 10 Kg, 20 kg, 25 Kg.
Cisternetta da Kg 1200

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE	
Frutticole (vite, pomacee, drupacee, agrumi, olivo, actinidia)	2-3 Kg/ha Pre e post fioritura; ingrossamento dei frutti
Orticole (pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, cetriolo, insalate, fragola) Colture industriali (girasole, soia, tabacco, etc.)	Pieno campo: 2,5-3 kg/ha
Colture in serra	Trattamenti post trapianto ogni 7-10 giorni: 150-200 ml/hl di acqua

FERTIRRIGAZIONE	
Tutte le colture	15-20 kg/ha

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova per evitare danni alle colture

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.