SCHEDA TECNICA

SPON® BIO

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Concime organico azotato fluido.

Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali

N + C 2 + 11

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Favorisce l'emissione e la crescita delle radici.

Riduce gli stress pedoclimatici dannosi per la pianta

Stimola le difese endogene della pianta favorendo il rendimento e la qualità della produzione.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Densità:	1,12 Kg/L
Colore:	Nero	pH (sol. al 10%):	8,87
Odore:	Caratteristico	Conducibilità:	23,48 mS/cm
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	2%
Azoto (N) organico solubile	2,0%
Carbonio (C) organico di origine biologica	11%

COMPONENTI

Borlanda ed estratti di borlanda.

PACKAGING

Flacone 0,250 Kg (cartone da 12 Kg), 1 Kg (cartone da 20 Kg).
Tanica da 5 Kg (cartone da 20 Kg), 12 Kg, 25 Kg.
Cisternetta da Kg 1100

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fertirrigazione

Orticole da foglia (insalata, lattughe, sedano, etc.), carciofo.

Post-trapianto, ripetere dopo sette giorni: 3-5 Kg/ha.

Floricole, orticole da frutto (pomodoro, peperone, zucchino, etc.), fragola, melone, anguria, carciofo.

Post-trapianto, ripetere dopo sette giorni: 3-6 kg/ha

Pomacee, drupacee, agrumi, vite, olivo, actinidia, etc.

300-400 g/hl (sol. 3-4‰), distribuendo 2-3 litri di soluzione per pianta.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Si consiglia l'utilizzo di SPON® BIO con COGISIN®.

La presenza della sostanze a base acquosa rendono il prodotto un efficace partner complementare per i prodotti di difesa.

Prima di effettuare il trattamento, diluire il prodotto con acqua sufficiente (1000 litri di acqua per fertirrigare un ettaro di superficie).

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.