SCHEDA TECNICA

SPON®

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Concime organo-minerale azotato

Azotato fluido in sospensione

N + C 8 + 9

FUNZIONI

Favorisce la crescita delle radici.

Riduce gli stress pedoclimatici dannosi.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Densità:	1,14 Kg/L
Colore:	Nero	pH (sol. al 10%):	7,65
Odore:	Caratteristico	Conducibilità:	31,5 mS/cm
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) organico solubile in acqua	2,5%
Azoto (N) ureico solubile in acqua	5,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica	9%

COMPONENTI

Concimi organici: epitelio animale idrolizzato fluido.
Concimi minerali: urea.
Estratti vegetali ed idrolizzati contenenti regolatori della crescita.
Amminoacidi totali 16,29%, amminoacidi liberi 3,18 %.

PACKAGING

Flacone 0,250 Kg (cartone da 12 Kg), 1 Kg (cartone da 20 Kg), 2 Kg (cartone da 24 Kg)
Tanica da 5 Kg (cartone da 20 Kg), 12 Kg, 25 Kg.
Cisternetta kg 1100

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fertirrigazione:

COLTURA	EPOCA DI APPLICAZIONE	DOSE PER HA
Orticole da foglia (insalate, lattughe, rucola, spinaci, sedano, etc.), carciofo. Orticole da bulbo (ravanello, cavolo rapa, mairubchen, etc)	Dopo la semina o il trapianto. Ripetere l'applicazione radicale dopo 7 gg	3-5 Kg/Ha
Orticole da frutto (pomodoro, zucchino, peperone, melanzana, etc.)	Dopo il trapianto. Ripetere l'applicazione radicale dopo 7 gg	3-6 Kg/Ha
Orticole da frutto (Fragola, melone, anguria)	Dopo il trapianto. Ripetere l'applicazione radicale dopo 7 gg	3-6 Kg/Ha
Colture in idroponica	Dopo il trapianto. Ripetere l'applicazione radicale dopo 7 gg	2-4 Kg/Ha
Florovivaismo (rosa, gerbera, garofano, etc.)	Dopo il trapianto. Ripetere l'applicazione radicale dopo 7 gg	3-4 Kg/Ha
Frutticole (Agrumi, Vite, Kiwi, Olivo)	Distribuire 20-30 Litri di soluzione per pianta	soluzione al 3-4‰

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Si consiglia l'utilizzo di SPON® con COGISIN®.

La presenza della sostanza a base acquosa rendono il prodotto un efficace partner complementare per i prodotti di difesa.

Prima di effettuare il trattamento, diluire il prodotto con acqua sufficiente (1000 litri di acqua per un ettaro di superficie) e fertirrigare nella fase finale dell'irrigazione in modo da raggiungere le radici.

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova per evitare danni alle colture.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.